

TOILETING HABIT PROFILE QUESTIONNAIRE-REVISED

PUNTUACIONES/SCORES

Bruto Raw score	Medida Measure Logits (Rasch)	Niños sin TDF Children without FDD
15	-4.41	
16	-3.08	
17	-2.23	
18	-1.66	
19	-1.21	
20	-.82	
21	-.46	
22	-.13	
23	.19	
24	.52	
25	.86	
26	1.23	
27	1.65	1.65 Min.
28	2.19	2.25 (-2 D.E./S.D.)
29	3.00	3.02 (-1 D.E./S.D.) Media/Mean: 3.79 D.E./S.D.: 0.77
30	4.29	

D.E.: Desviación estándar

TDF: Trastorno Funcional de la Defecación

Min.: Puntuación más baja registrada para el grupo

S.D.: Standard Deviation

FDD: Functional Defecation Disorder

Min.: Lowest score registered for the group

SCORING: Total score is based on the 15 hiper-reactivity items. Our research (n=276) shows that children without FDD obtain almost perfect scores. Therefore any score below 3.02 (raw score of 29), should be considered as a possible manifestation of toileting difficulties or/and sensory hiper-reactivity.

PUNTUACIÓN: la puntuación total se basa en los 15 ítems de hiperreactividad. Nuestra investigación (n = 276) muestra que los niños sin TDF obtienen puntuaciones casi perfectas. Por lo tanto, cualquier puntaje por debajo de 3.02 (puntaje bruto de 29), debe considerarse como una posible manifestación de dificultades para ir al baño y / o hiperreactividad sensorial.

Beaudry-Bellefeuille, I., Bundy, A., Lane, A., Ramos-Polo, E. & Lane, S. J. (2018). The Toileting Habit Profile Questionnaire; Examining Construct Validity using the Rasch Model. *British Journal of Occupational Therapy*

Beaudry-Bellefeuille, I., Lane, A., Ramos-Polo, E., & Lane, S. J., (2019). Examining sensory over-reactivity to defecation related sensations in children with functional defecation disorders. *Annals of Colorectal Research*, 7(4)